


...如急性充血性心衰）、饮酒过量、肝损伤。

...降低二甲双胍相关乳酸酸中毒...
...量、禁忌、注意事项]。
...胍相关的乳酸酸中毒，应立即停...
...的一般性支持治疗，建议立即...
...事项]。

...胍相关的乳酸酸中毒的报告，包...
...发病隐蔽并仅伴有非特异性症...
...痛、呼吸窘迫、嗜睡，严重的...
...性缓慢型心律失常。二甲双胍...
...特征有血乳酸水平升高（>5...
...低（酮尿或酮血症）、阴离子...
...或酮血症）、乳酸/丙酮酸比...
...的浓度通常>5 μg/mL。二甲双...
...的摄入，从而增加血液中乳酸的...
...的风险，尤其是高风险的患者。
...胍相关的乳酸酸中毒，应立即开...
...治疗，同时立即停止服用本品。
...怀疑乳酸酸中毒的患者，推荐...
...酸中毒，排除蓄积的二甲双胍...
...好时盐酸二甲双胍可以170...
...透析），经过这样的治疗通常症

...于乳酸酸中毒症状的教育，如果...
...停止服用本品并就医。
...能存在的二甲双胍相关乳酸酸中...
...的方法降低风险和进行管理：
...二甲双胍相关的乳酸酸中毒病例...
...功能损伤的病人中。因为二甲双...
...肾功能损伤增加了二甲双胍蓄...
...的风险。临床建议基于患者的...
...】：
...估算的肾小球滤过率（eGFR）。
...in/1.73m²的患者应禁止服用，
.../1.73m²减量。
...应至少每年检测eGFR，可能有...
...者（如老年人），应当更频繁的

...特定药物可能会增加二甲双胍相...
...，如损伤肾功能、导致明显血流...
...减平衡、增加二甲双胍蓄积的药...
...。
...龄与二甲双胍相关的乳酸酸中毒...
...年患者比年轻患者更可能有肝、...
...患者应密切评估肾功能。
...查--二甲双胍治疗的患者静脉注...
...急性肾功能改变，发生乳酸酸中...
...mL/min/1.73m²之间的患者应在...
...或之前应停止服用本品，有肝损...
...衰竭病史的患者给予动脉灌注碘...
...品。造影结束48小时后重新评估...
...可以重新开始用药。
...其他操作过程对食物和液体的限...
...减少、低血压和肾功能损伤的风

